# Recomendaciones para el tamizaje de rutina del cáncer cervical <sup>1</sup>

#### Mujeres menores de 30 años

Se realizará la tamización de oportunidad con citología, a partir del criterio y evaluación de antecedentes y factores de riesgo<sup>3</sup>

#### Población en riesgo

Trabajadoras sexuales, pacientes inmunocomprometidos, pacientes trasplantadas, multíparas, pacientes con 10 años de actividad sexual, mujeres transgénero.



## Mujeres de 30 a 65 años

A partir de los 30 años y hasta los 65 años, la tamización obligatoria será con las pruebas ADN-VPH.

# Mujeres mayores de 65 años

A partir de los 65 años se suspende la tamización para cáncer de cuello uterino, siempre y cuando las pruebas de tamización previas, en los últimos 5 años, específicamente las de ADN-VPH tengan resultado negativo.

En caso contrario continuar seguimiento según algoritmos para lesiones pre neoplásicas.

## Mujeres con histerectomía

No examen en mujeres que se han sometido a una histerectomía con extirpación del cuello uterino y que no tienen antecedentes de una lesión precancerosa de alto grado (es decir, neoplasia intraepitelial cervical [NIC] de grado 2 o 3) o cáncer de cuello uterino.<sup>2</sup>

- **1.** Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2022). Lineamiento para la implementación del plan nacional de prevención del cáncer de cuello uterino mediante la detección molecular por genotipificación del virus del papiloma humano (VPH) de tipo 16-18 y otros de alto riesgo. Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.
- **2.** US Preventive Services Task Force, Curry SJ, et al. Screening for cervical cancer: US preventive services task force recommendation statement. JAMA [Internet]. 2018 [citado el 28 de febrero de 2024];320(7):674. Disponible en: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2697704
- 3. Arrossi, S., Thouyaret, L., & Paul, L. (2015). Prevención del cáncer cervicouterino: recomendaciones para el tamizaje, seguimiento y tratamiento de mujeres en el marco de programas de tamizaje basados en el test de VPH: actualización 2015. Instituto Nacional del Cáncer. https://www.msal.gob.ar/inc/

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EUA y sus afiliadas. Todos los derechos reservados. Av. Naciones Unidas E10-44 y República de El Salvador Edificio Citiplaza, piso 6. Quito-Ecuador. Prohibida su reproducción parcial o total. En caso de requerir información médica adicional o reportar efectos adversos, comuníquese al correo electrónico aquimsd.ecuador@msd.com